arXiv:1602.06738v1 [math.FA] 22 Feb 2016

Приближение линейных функционалов на пространстве с выпуклой мерой

Д.В. Фуфаев *

Пусть (X, μ) - топологическое векторное пространство с заданной на нем вероятностной мерой. Существует два опеределения измеримого линейного функционала на X:

1) f как отображение является измеримой и линейной функцией со значениями в $\mathbb{R}$ (иногда такие функционалы называют почти линейными).

2) f - предел почти всюду непрерывных линейных функционалов.

В книге Гихмана и Скорохода [3, теорема VIII.1.1] было сформулировано, что для гильбертовых пространств эти два определения эквивалентны всегда, однако вскоре были построены контрпримеры, показывающие, что это неверно (например, в [4]). Поэтому актуальным стал вопрос - для каких классов мер на каких пространствах эти определения эквивалентны, то есть измеримый и линейный функционал приближается почти всюду конечномерными? Известно, что эти определения эквивалентны для класса центрированных гауссовских мер(см. [1, теорема 2.7.8]).

Есть гипотеза, что это верно для класса выпуклых мер. Класс выпуклых мер является обобщением класса гауссовских мер. Пока что выясняется, что свойства гауссовских мер присущи и выпуклым мерам, однако это выяснено далеко не для всех свойств, и соответствующие доказательства на порядок сложнее.

В работе исследуются линейные функционалы для выпуклых продакт-мер на счетном произведении конечномерных пространств. Устанавливается эквивалентность этих двух определений для некоторых классов таких мер. Основным инструментом доказательства являются условные математические ожидания.

1. Предварительные сведения.

Определение 1. *Вероятностная мера μ на σ-алгебре $\sigma(X)$ в локально выпуклом пространстве X называется выпуклой (или логарифмически вогнутой), если для всех множеств $A, B \in \sigma(X)$ и всех $\lambda \in [0, 1]$ выполнено неравенство*

$$\mu(\lambda A + (1 - \lambda)B) \geq \mu(A)^{\lambda}\mu(B)^{1-\lambda}.$$

Так как рассматриваемые меры будут произведениями конечномерных, то нам понадобится следующая характеризация конечномерных выпуклых мер:

Лемма 1. *Мера μ на конечномерном пространстве $\mathbb{R}^m$ выпукла тогда и только тогда, когда найдутся аффинное отображение $T : \mathbb{R}^l \to \mathbb{R}^n$ и вероятностная мера ν с плотностью $p = e^{-V}$ на $\mathbb{R}^l$, где V — выпуклая функция (вне области определения V полагаем $p = 0$), причем $\nu = \mu \circ T^{-1}$.*

*Механико-математический факультет Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, Россия; e-mail: fufaevdv@rambler.ru

Отсюда, в частности, следует, что носитель меры μ в $\mathbb{R}^m$ - выпуклое множество, лежащее в некотором аффинном подпространстве.

Также нам понадобится следующее свойство выпуклых мер:

Лемма 2. *Пусть X — локально выпуклое пространство с выпуклой мерой μ, p — измеримая относительно μ полунорма, конечная почти всюду. Тогда $p \in L^1(\mu)$.*

Учитывая, что если f — почти линейный измеримый функционал на X, то $|f|$ — почти всюду конечная измеримая полунорма, получаем, что $f \in L^1(\mu)$.

Доказательства лемм 1-2 можно найти в [5].

Напомним теперь определение условного математического ожидания. Пусть $(X, \mathfrak{F}, \mu)$ — пространство с мерой и $\mathfrak{B}$ — некоторая под-σ-алгебра в $\mathfrak{F}$.

Определение 2. *Пусть $f \in L^1(\mu)$. Условным математическим ожиданием f относительно σ-алгебры $\mathfrak{B}$ и меры μ называется такая $\mathfrak{B}$-измеримая μ-интегрируемая функция $\mathbb{E}_\mu^{\mathfrak{B}} f$, что*

$$\int\limits_X g f d\mu = \int\limits_X g \mathbb{E}_\mu^{\mathfrak{B}} f d\mu$$

для всякой ограниченной $\mathfrak{B}$-измеримой функции g.

Рассмотрим теперь пространство $\mathbb{R}^\infty$ как произведение конечномерных пространств: $\mathbb{R}^\infty = \prod\limits_{k=1}^{\infty} \mathbb{R}^{m_k}$, где $\{m_k\}_{k=1}^\infty$ - последовательность натуральных чисел. Пусть $\{\mu_k\}_{k=1}^\infty$ - последовательность выпуклых мер, заданных на соответствующих $\mathbb{R}^{m_k}$. Тогда мера $\mu := \bigotimes\limits_{k=1}^{\infty} \mu_k$, заданная на $\mathbb{R}^\infty$, также выпукла. Будем рассматривать именно такие меры.

Также введем обозначения $\tilde{m}_n = \sum\limits_{k=1}^{n} m_k,\ \tilde{\mu}_n = \bigotimes\limits_{k=1}^{n} \mu_k$.

Лемма 3. *Пусть $\mathfrak{B}_n$ — сигма-алгебра, порожденная первыми $\tilde{m}_n$ координатными функциями. Тогда*

$$\mathbb{E}^{\mathfrak{B}_n} f(x_1, \dots, x_{m_n}) = \int\limits_{\prod\limits_{k=n+1}^{\infty} \mathbb{R}^{m_k}} f(x_1, \dots, x_{m_n}, x_{m_n+1}, \dots) \left(\bigotimes_{k=n+1}^{\infty} \mu_k \right) (d(x_{m_n+1}, \dots)),$$

где интегрирование ведется по произведению прямых,
соответствующему переменным x_k с $k \geq m_n + 1$.

При этом, когда f — линейный функционал, верно следующее представление:

$$\mathbb{E}^{\mathfrak{B}_n} f(x_1, \dots, x_{m_n}) = f(x_1, \dots, x_{m_n}, 0, \dots) +$$

$$+ \int\limits_{\prod\limits_{k=n+1}^{\infty} \mathbb{R}^{m_k}} f(0, \dots, 0, x_{m_n+1}, \dots) \left(\bigotimes_{k=n+1}^{\infty} \mu_k \right) (d(x_{m_n+1}, x_{m_n+2}, \dots)).$$

Этот функционал — конечномерный аффинный (т.е. сумма линейного и константы), поэтому он непрерывен.

Лемма 4. *Функции $\mathbb{E}^{\mathfrak{B}_n} f$, рассматриваемые как функции на $\mathbb{R}^\infty$, сходятся к f почти всюду при $n \to \infty$.*

Доказательства лемм 3-4 можно найти в [2, §10.1 и 10.2].

2. Основные результаты.

Теорема 1. Пусть найдется такой номер q, что носитель меры μ_q лежит в аффинном подпространстве, то есть в не проходящем через ноль. Тогда измеримый линейный функционал f приближается непрерывными линейными μ-п.в.

Доказательство.

Носитель меры μ_k — это аффинное подпространство $H_k = L_k + h_k$, где L_k - линейное подпространство в $\mathbb{R}^{m_k}$ и $h_k \in H_k$. Напомним, что найдется такой номер q, что носитель меры μ_q является аффинным, то есть не проходит через ноль (что равносильно $h_q \neq 0$). Тогда и конечномерные проекции μ на пространства $\mathbb{R}^{\tilde{m}_k}$ (т. е. меры $\tilde{\mu}_k = \bigotimes_{j=1}^{k} \mu_j$) при $k \geq q$ также будут иметь аффинные носители вида $\tilde{H}_k = \tilde{L}_k + \tilde{h}_k$, где $\tilde{L}_k = L_1 \oplus L_2 \oplus \cdots \oplus L_k$, $\tilde{h}_k = h_1 + h_2 + \cdots + h_k$, причем $\tilde{h}_k \neq 0$.

Для $k \geq q$ построим линейные функционалы $\psi_k(x)$ на $\mathbb{R}^\infty$, такие что

$$\psi_k(\tilde{h}_k) = \int_{\prod_{j=k+1}^{\infty} \mathbb{R}^{m_j}} f(0, \dots, 0, x_{m_k+1}, \dots) \left(\bigotimes_{j=k+1}^{\infty} \mu_j \right) (d(x_{m_k+1}, \dots)),$$

$$\psi_k|_{\tilde{L}_k} = 0, \ \psi_k|_{\prod_{j=k+1}^{\infty} \mathbb{R}^{m_j}} = 0$$

(такие существуют, например, по теореме Хана-Банаха). После этого построим функционалы (уже аффинные) ϕ_k по формуле $\phi_k(x) = \psi_k(x - \tilde{h}_k)$, которые тоже будут зависеть только от первых $\tilde{m}_k$ координат. Теперь рассмотрим последовательность функционалов $g_k = \mathbb{E}^{\mathfrak{B}_k} f + \phi_k$. Это, очевидно, аффинные функционалы. Нетрудно проверить, что g_k — линейные функционалы (т.к. в начале координат принимают значение ноль). Кроме того, g_k совпадает с $\mathbb{E}^{\mathfrak{B}_k} f$ на носителе меры $\bigotimes_{j=1}^{k} \mu_j$ (т.е. на $\tilde{H}_k$), поэтому они совпадают $\bigotimes_{j=1}^{k} \mu_j$-почти всюду, а значит, так как оба зависят только от первых $\tilde{m}_k$ координат, μ-почти всюду. Поэтому, так как $\mathbb{E}^{\mathfrak{B}_k} f$ сходились к f μ-почти всюду, то и g_k будут сходиться к f μ-почти всюду. Отсюда заключаем, что g_k — последовательность конечномерных линейных функционалов, сходящихся к f почти всюду.

□

Теорема 2. Пусть носитель каждой меры μ_k симметричен относительно нуля (частный случай — когда мера симметрична относительно начала координат). Тогда измеримый линейный функционал приближается конечномерными линейными μ-п.в.

Доказательство.

Пусть μ^- — мера, полученная из μ отражением относительно нуля, она также будет произведением отражений исходных конечномерных мер, то есть $\mu^- = \bigotimes_{k=1}^{\infty} \mu_k^-$, и все отражения также будут выпуклыми. Исходные меры μ, μ_k будем обозначать как μ^+, μ_k^+. Функционал f будет также μ^--измерим, поэтому можно построить его условные математические ожидания и по этой мере. Условные математические ожидания относительно μ^+, μ^- будем обозначать $\mathbb{E}_+^{\mathfrak{B}_n} f, \mathbb{E}_-^{\mathfrak{B}_n} f$ соответственно.

Эти последовательности сходятся к f почти всюду по мерам μ^+ и μ^- соответственно, каждая по своей, вообще говоря. Но по условию, носитель каждой конечномерной меры симметричен относительно нуля, поэтому носитель отраженной меры будет совпадать с носителем исходной меры.

Значит, исходная мера и отраженная будут абсолютно непрерывны относительно друг друга, значит, эти последовательности сходятся к f почти всюду по обоим мерам. Возьмем полусумму этих последовательностей, которая также будет сходиться к f μ^+-п.в. Очевидно, полусумма имеет следующий вид:

$$f(x_1,\dots,x_{m_n},0,\dots)+\frac{1}{2}\int_{\prod_{k=n+1}^{\infty}\mathbb{R}^{m_k}} f(0,\dots,x_{m_n+1},\dots)\left(\bigotimes_{k=n+1}^{\infty}(\mu_k^+ + \mu_k^-)\right)(d(x_{m_n+1},\dots))$$

Во втором слагемом в интеграле мера уже симметрична. Поэтому, так как интегрируется антисимметричная функция по симметричной мере, второе слагаемое равно нулю. Получили, что данная полусумма — последовательность конечномерных линейных функций, сходящихся к f μ-п.в.

Отметим, что в случае симметричной меры отраженная совпадает с исходной, и если все μ_k были симметричными мерами, то и мера μ была бы симметричной, откуда следует, что искомый вид имели бы уже сами математические ожидания, и необходимости брать полусумму не имелось бы.

□

Из определения интеграла Лебега как верхней грани интегралов простых функций видно, что

$$\int_{\prod_{j=k+1}^{\infty}\mathbb{R}^{m_j}} f(0,\dots,0,x_{m_k+1},\dots)\left(\bigotimes_{j=k+1}^{\infty}\mu_j^+\right)(d(x_{m_k+1},x_{m_k+2},\dots)) =$$

$$= -\int_{\prod_{j=k+1}^{\infty}\mathbb{R}^{m_j}} f(0,\dots,0,x_{m_k+1},\dots)\left(\bigotimes_{j=k+1}^{\infty}\mu_j^-\right)(d(x_{m_k+1},x_{m_k+2},\dots)).$$

Теорема 3. Если f — μ-измеримый линейный функционал, причем числовая последовательность

$$c_k=\int_{\prod_{j=k+1}^{\infty}\mathbb{R}^{m_j}} f(0,\dots,0,x_{m_k+1},\dots)\left(\bigotimes_{j=k+1}^{\infty}\mu_j\right)(d(x_{m_k+1},x_{m_k+2},\dots))$$

стремится к нулю, то f приближается непрерывными линейными функционалами μ-п.в.

Доказательство.

Как и раньше, имеем

$$\mathbb{E}_{\pm}^{\mathfrak{B}^n} f(x_1,\dots,x_{m_n}) = f(x_1,\dots,x_{m_n},0,\dots)\pm c_n$$

Тогда, для любого $x\in\mathbb{R}^\infty$ имеем

$$|\mathbb{E}_-^{\mathfrak{B}^n} f(x)-f(x)|\le|\mathbb{E}_-^{\mathfrak{B}^n} f(x)-\mathbb{E}_+^{\mathfrak{B}^n} f(x)|+|\mathbb{E}_+^{\mathfrak{B}^n} f(x)-f(x)| = 2c_n+|\mathbb{E}_+^{\mathfrak{B}^n} f(x)-f(x)|$$

Последнее выражение стремится к нулю для почти всех x по мере μ, так как $\mathbb{E}_+^{\mathfrak{B}^n} f$ сходится к f почти всюду, поэтому последовательность функционалов $\mathbb{E}_-^{\mathfrak{B}^n} f$ также сходится к f почти всюду.

Теперь, как и в предыдущем утверждении, взяв полусумму этих последовательностей, получаем искомую последовательность.

□

3. Заключение.

Полученные результаты показывают эквивалентность определений измеримого линейного функционала для выпуклых продакт-мер на $\mathbb{R}^\infty$, кроме случая, когда носитель каждой меры лежит в линейном подпространстве $\mathbb{R}^{m_k}$, при этом нельзя найти аффинное подпространство, в котором он полностью содержится, и свойства навроде симметричности носителя нет. Теорема 3 дает достаточное условие для эквивалентност, поэтому она также дает один из возможных путей обработки оставшегося случая — доказать, что условие теоремы 3 в этом случае будет выполняться.

Список литературы

[1] Богачев В.И. «Гауссовские меры». Москва: Наука. Физматлит, 1997, 352 с.

[2] Богачев В.И. «Основы теории меры» Т.2. 2-е изд. Москва-Ижевск: РХД, 2006, 680 с.

[3] Гихман И.И., Скороход А.В. «Теория случайных процессов» т.1. Москва: Наука. Физматлит, 1971, 664 с.

[4] Скороход А.В. «Линейные и почти линейные функционалы на измеримом гильбертовом пространстве», ТВП, 23:2 (1978), 397-402.

[5] Borell C. «Convex measure on locally convex spaces», Ark. Math. 1974. V. 12, N 2. P. 239-252.